



Con un incendio , Yo Muero



Imágenes extraídas de la Guía de Campo editada y publicada por la Corporación Chilena de la Madera: "Fauna de los Bosques Templados de Chile. Guía de Campo de los vertebrados terrestres." de Celis-Diez JL, S Ippi, A Charrier & C Garín (2011).



@altoincendios
Altoincendiosforestales
www.corma.cl



Adesmia bijuga

Phil.

Familia: Fabáceas.

Crece en la costa de la Región del Maule, al margen de plantaciones de pinos. Arbusto de ramas largas, de hasta 2m de altura por similar diámetro. Florece en primavera.

Su propagación por semillas se dificulta debido a que son atacadas por un escarabajo de tipo bruco. Se siembran en almácigo estratificado durante el verano o en almácigo normal a fines de invierno.

Es importante su propagación por tratarse de una planta escasa, su cultivo en jardines contribuiría a su conservación ex situ.



Escasa, en peligro de extinción.



Berberis negeriana

Tischler

Familia: Berberidáceas.

Endémica de la Región del Bío Bío. Florece desde fines de primavera y durante el verano. Fruto oblongo, gris azulado, con estilo persistente de 3 mm, madura en verano y otoño.

Crece como sotobosque de *Nothofagus obliqua* (roble). Vive sólo en las cercanías de Chiguayante y en el valle de Nonguén entre 200 y 300 msnm.

Plantar en jardines o macetas, su cultivo en parques y jardines contribuirá a su conservación ex situ.



En peligro crítico de extinción.



Scutellaria valdiviana

(Clos.) Epling

Familia: Lamiáceas (Labiadas).

Endémica de Chile. Regiones del Maule a la de Los Lagos. Arbusto siempreverde, de hasta 1,5 m de altura. Florece en primavera. Fruto formado por 4 nuecesitas negruzcas que maduran a comienzos del verano.

Crece en los claros o en los márgenes de los bosques sombríos y húmedos, en suelos ricos en materia orgánica. Se encuentra en la cordillera de la Costa entre los 50 y los 300m de altitud.

En jardines se cultivaría como arbusto en lugares húmedos y sombríos. Plantarla en parques y jardines ayudaría a su conservación.



En peligro.



Gaultheria renjifoana

Phil.

Familia: Ericáceas.

Endémica de Chile. Región del Bío-Bío, sólo en la costa entre Colcura y Chivilingo. Arbusto siempreverde, de hasta 2,5 m de altura por 1,5 m de diámetro. Ramas abundantes y flexibles. Florece en primavera. Fruto, una cápsula, en su madurez rodeada por sépalos rosados, carnosos; maduros en verano.

Crece en sitios húmedos, como fondos de quebrada; crece solo en una localidad en pequeñas zonas residuales de bosque nativo.

Por ser una especie muy escasa y amenazada es muy importante para su conservación su cultivo ex situ en parques y jardines para su mejor cuidado.



En peligro crítico de extinción.