



Huingán, Borocoi , Boroco, Molle, Incienso

Schinus polygamus (Cav.) Cabr.

Anacardiaceae

Descripción: Arbusto o arbolito perenne de hasta 3 m de altura por 2,5 de diámetro, ramificado desde la base. Tronco color ceniciento y aspecto tortuoso con ramas terminales transformadas en espinas. Hojas alternas, polimorfas y subcoriáceas. Flores axilares, naciendo varias en un mismo punto o en racimos, las masculinas y femeninas en plantas separadas. Su fruto es una drupa redondeada que va del color violáceo a negruzco.

Distribución: Regiones Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos.

Hábitat: Forma parte del bosque esclerófilo de la zona central. Prefiere suelos pobres de exposición norte y se desarrolla tanto en planicies como en laderas.

Usos comestibles: Los frutos del huingán se consumen frescos. Con ellos también se elabora chicha y aguardiente. La chicha se bebe con harina tostada. Además, con la decocción de toda la planta se hace una especie de miel.

Usos medicinales: El látex de la corteza se usa para curar cataratas y colocado sobre un papel para tratar dolores e irritaciones en la piel. La infusión de las hojas se usa para lavar heridas. La decocción de la corteza se utiliza para combatir dolores artríticos y dolores de pies. La miel se recomienda en el tratamiento de la bronquitis crónica y la resina de su tronco se usa como purgante y digestivo.

Propagación: Se propaga por semilla en almácigo estratificado en otoño. La mezcla de suelo es de una parte de compost, una de tierra de jardín y una de arena. Se replica a bolsa cuando tiene dos hojitas verdaderas.

Observaciones: Especie de gran potencial ornamental para ser plantado en jardines, parques o como cerco vivo debido a sus ramas punzantes.

