

# Eriosyce calderana

(Ritter) Ferryman 2005

## Sinónimo:

*Pyrrhocactus calderanus* Ritter 1961

*Pyrrhocactus pulchellus* Ritter 1980

*Eriosyce taltalensis* ssp. *pilisipina* (Ritter) Kattermann 1994

## Etimología:

*calderana*: Relativo a la localidad de Caldera.

## Distribución:

Desde Cifuncho en la Región de Antofagasta hasta el norte de Chañaral en la Región de Atacama.

## Descripción de la planta:

**Cuerpo:** Solitario, de 5 a 8 cm. de diámetro en promedio, verde. **Costillas:** De

13 a 15, obtusas y tuberculadas. **Areolas:** Con motitas de lana cuando nuevas.

**Espinas:** Grisáceas, recurvadas, de 3 a 5 espinas centrales y de 8 a 10 radiales.

**Raíz:** Napiforme. **Flores:** De 3,25 a 4,25 cm., amarillentas a blanquecinas y

carmin. **Fruto:** De color amarillento.

## Hábitat:

Este especie la encontramos en los cerros costeros desde el sur de Chañaral, hasta Cifuncho. En zonas muy áridas, pero con influencia de la camanchaca.

Su espinación es muy variable en cuanto a grosor y color. Las más sureñas *E. taltalensis* ssp. *pilisipina*, son de espinas tipo pelos, muy delgadas, retorcidas y

el color varía desde los negros a los blanquecinos. Las más nortinas son de espinas más gruesas curvas pero menos retorcidas y van desde los tonos amarillos

a rojizos, éstas serían las llamadas *Pyrrhocactus pulchellus*. Las flores también

varían desde los amarillo-blancos a los tonos carmín. Las amenazas de esta especie son una mezcla entre la gran sequedad del lugar y la colecta por parte de coleccionistas.

