

Eulychnia breviflora

Philippi 1860

Sinónimo:

Eulychnia barquitenis Ritter 1980

Eulychnia breviflora var. *tenuis* Ritter

Eulychnia breviflora var. *taltalensis* Ritter

Etimología:

breviflora: Epíteto latino que significa con pequeñas flores.

Distribución:

Regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Descripción de la planta:

Cuerpo: Arbustivo o arborescente, muy ramificado, de 2 a 3 m de altura, las ramas de 6 a 10 cm. de diámetro; con epidermis verde pasto. **Costillas:** De 10 a 13 costillas, redondeadas. **Areolas:** Con separación de 5 a 15 mm. **Espinas:** Café oscuras cuando nuevas y grises con la edad, derechas. Las centrales de 3 a 6, de 5 a 15 cm. de largo (1 o 2 más largas que las demás). Las radiales de 10 a 22, variables, de pocos mm. hasta 3 cm. **Flores:** Cercanas al ápice, de 7 a 8 cm. de largo x 5 a 6 cm. de ancho, pericarpelo con escamas pequeñas, con densa lanosidad y cerdas de color amarillo brillante a marrones. Tépalos blanco-rosados con borde más oscuro, usualmente con base rosada. **Fruto:** Redondo, de hasta 6 cm. de diámetro, verdoso, cubierto con pelos lanosos dorados. Carne blanca y ácida. **Semilla:** Numerosas, 2 mm., de color negro mate o marrón oscuro.

Hábitat:

Esta especie tiene gran diversidad de formas, y estas variaciones han recibido poco estudio. Por ahora solo rige la clasificación ideada por Britton & Rose 1922. Por lo que seguiremos usando ese método. Este dice que, los frutos están cubiertos por una densa lanosidad dorada y brillante.

