

Browningia candelaris

(Meyen) Britton & Rose 1920

Sinónimo:

Cereus candelaris (Meyen) 1833

Etimología:

candelaris: Por la forma de candelabro.

Distribución:

Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá. Habita desde el sur de Perú hasta el extremo norte de Chile, en Mamiña.

Descripción de la planta:

Cuerpo: Tronco como árbol de hasta 50 cm. de diámetro y de 3 a 5 mts. de altura. Espinado en la base y alcanzada cierta altura sus ramas son desnudas, sin espinas; erectas o recurvadas. **Costillas:** De 27 a 33, aplanadas. **Areolas:** Ovaladas y grandes. **Espinas:** Muy numerosas, hasta 50 por areola y de hasta 15 cm. de longitud, de color marrón y grises. **Flores:** Grandes, de 8 a 12 cm. Recubiertas por escamas de color marrón; los tépalos varían del blanco al rosado. **Fruto:** Carnoso, algo ácido. **Semillas:** Negras, grandes de 2,2 x 1,7 mm.

Hábitat:

Esta maravillosa especie se reconoce fácilmente por tener la forma de un candelabro, espinudo en su base y en ejemplares jóvenes. Después de cierta altura, donde los animales no alcanzan sus ramas ni frutos para comérselos, se vuelven desnudas, sin espinas.

Se puede apreciar ejemplares en el camino desde Arica a Putre, creciendo a 2.500 msnm, en montañas muy áridas casi sin ninguna otra vegetación presente; sólo la acompañaban algunos *Haageocereus*. También debido a tal aridez pudimos notar la casi nula regeneración de estas especies.

