

Eriosyce eriosyzoides

(Ritter) Ferryman 2003

Sinónimo:

Horridocactus eriosyzoides Ritter 1959

Pyrrhocactus eriosyzoides var. domeykoensis Ritter

Pyrrhocactus transitensis (Ritter)

Etimología:

eriosyzoides: Con forma de *Eriosyce* (sensu Philippi).

Distribución:

Región de Atacama y Coquimbo. Habita desde la Cordillera de los Andes, en el valle del río Huasco y del río Elqui y por allí se distribuye hacia la costa.

Descripción de la planta:

Cuerpo: Subglobular a cilíndrico, de 9 a 14 cm. de diámetro en promedio, hasta 40 cm de alto (ejemplares añosos); de color verde azulado a verde oscuro.

Costillas: De 13 a 17 en ejemplares adultos y de 7,5 a 12,5 mm. de altura, tuberculadas.

Areolas: Separadas de 5 a 20 mm entre sí. **Espinas:** De color amarillo pálido o gris oscuro, curvadas hacia arriba, de 1 a 7 espinas centrales, de 2 a 5 cm. de longitud, más oscuras en la punta; de 10 a 15, de 1,5 a 4 cm. de longitud.

Raíz: Fibrosa y tuberosa. **Flores:** Hasta de 3,25 cm. de longitud, de color amarillento con tépalos externos rojizos. **Fruto:** De 2 x 1,5 cm., verde, verde-rojizo o rara vez rojo.

Hábitat:

Esta especie se encuentra en valles como el del río Elqui y el Huasco; se han visto cercanos a la Cordillera de Los Andes, en afloramientos rocosos, en laderas empinadas; formando cuerpos grandes y alargados. Los cuerpos son similares a los de los "sandillones", por el tamaño, pero eso *Eriosyzoides* se les diferencia por las flores y frutos desnudos.

