


■ *Liolaemus uniformis* Troncoso-Palacios, Elorza, Puas & Alfaro-Pardo, 2016

Nombre común: Lagarto uniforme.



Etimología: Del latín *unus* ("uno") y *formis* ("forma"), referido a la carencia de patrón de coloración dorsal y al color uniforme de machos y hembras.

Reconocimiento: Es de tamaño grande y de aspecto macizo. La cola es de longitud cercana a una vez y media el resto del cuerpo. La cabeza es levemente más larga que ancha y su cuello plegado y de ancho similar o un poco mayor. Las extremidades son robustas y largas. El dorso presenta escamas redondeadas, grandes, quilladas, de disposición imbricada o subimbricada. En el vientre las escamas son un poco más grandes, redondeadas, lisas e imbricadas. Los machos poseen dos o tres poros precloacales. La coloración general es café grisáceo, amarillenta o verdosa. No presenta un patrón de coloración dorsal discernible, aunque algunos individuos pueden presentar líneas transversales oscuras en las zonas dorsolaterales o manchitas amarillas en la cabeza y el dorso. El vientre es de color amarillento con la región gular gris oscura.

Distribución: Se considera endémica de la Cordillera de los Andes de la Región de Valparaíso, entre 2.400 a 3.300 msnm, aunque es probable su presencia en Argentina. Hay registros en Altos de Petorca, Quebrada Los Piuquenes y en el Tranque Alicahue.

Historia natural: Habita sectores cordilleranos con presencia de piedras y vegetación herbácea y arbustiva de baja altura dominada por *Chuquiraga sp.* y *Azorella sp.* Es común en sectores vecinos a humedales de altura. Se ha visto el consumo de insectos y en los análisis intestinales también se han encontrado restos vegetales. Presenta mayor actividad al mediodía.

