


■ *Liolaemus bellii* Gray, 1845

Nombre común: Lagartija parda de Santiago. *Brown lizard.*



Etimología: Dedicada a Thomas Bell, zoólogo inglés con numerosos trabajos en Historia Natural.

Reconocimiento: Es de tamaño mediano a grande y textura maciza, la cola puede alcanzar el doble del tamaño del cuerpo o ser levemente más corta. El cuello está plegado y es más ancho que la cabeza. Las extremidades son cortas y fornidas. Las escamas dorsales son de tamaño mediano, de forma sublanceolada y algunas presentan mucrón, de superficie quillada y disposición imbricada. Las escamas del vientre son de mayor tamaño, de forma redondeada, superficie lisa y disposición imbricada. Solo los machos pueden presentar dos o tres poros precloacales y algunos carecen de estos. La coloración es bastante variable, en general el color de fondo es café, café amarillento o verdoso oliváceo y su patrón se caracteriza por manchas en forma de V semiextendidas, transversales y bordeadas posteriormente de color blanco amarillento. Los flancos son más oscuros y su vientre de color amarillo verdoso o verdoso grisáceo. En los ejemplares más grandes el patrón dorsal es poco evidente.

Distribución: Es endémica de la Cordillera de los Andes de Chile central. Se encuentra desde el Río Rocín (Putendo, Región de Valparaíso) hasta Chapa Verde (Región de O'Higgins), entre 2.000 y 3.500 msnm. Se registra en el valle del Río San Francisco, Yerba Loca, Farellones, Valle Nevado y cerro San Ramón, entre otras localidades.

Historia natural: Habita laderas rocosas y entornos de humedales cordilleranos. Toma el sol sobre rocas bajo las que se refugia rápidamente frente a posibles amenazas. También ocupa la vegetación como escondite. Es omnívora y de reproducción vivípara.

