


■ *Tarentola mauritanica* (Linnaeus, 1758)

Nombre común: Salamunqueja. Geko africano. *Common wall gecko*.

Moorish gecko.



Etimología: Referido a Mauritania, país donde se encuentra la “*terra typica*”.

Reconocimiento: Es de tamaño mediano a grande, con la cola de una longitud semejante al resto de su cuerpo. Presenta el cuerpo, la cabeza y la cola aplastados. Los dedos presentan almohadillas digitales ensanchadas con protuberancias laminares laterales e inferiores que le proporcionan cierta adherencia al trepar y desplazarse por superficies verticales. Posee 10 a 14 hileras de grandes tubérculos característicos en el dorso, que están rodeados de otros tubérculos de menor tamaño. La coloración varía entre café y gris con cuatro o cinco bandas transversales oscuras irregulares. El vientre es blanquecino o amarillento. Los ejemplares juveniles presentan forma y coloración similar a los adultos.

Distribución: Es originaria de los países africanos y europeos del Mar Mediterráneo Occidental. En Chile existen registros en las instalaciones y túneles del Metro de Santiago, en Peñalolén y en Limache.

Historia natural: Muestra actividad tanto diurna como nocturna, aunque pareciera tener mayor actividad en horarios crepusculares. La coloración tiende a ser muy oscura durante el día y más clara durante la noche. Al ser capturado emite un chillido. También, en condiciones naturales se han reportado otros sonidos atribuibles a un tipo de comunicación acústica con sus conespecíficos. La dieta es muy variada, principalmente en invertebrados, prefiriendo coleópteros, arácnidos, himenópteros, lepidópteros y larvas de insectos, aunque también, se ha reportado consumo semillas y restos de frutos. Caza al acecho a aquellos insectos atraídos por la luz artificial. Cada hembra tiene una a tres puestas por año en las que deposita uno o dos huevos bajo piedras, bajo cortezas, bajo tejas, en grietas, en troncos de árboles o enterrados en el suelo. El período de incubación depende de la temperatura y generalmente oscila entre uno y dos meses. Aunque se desconoce el origen de los individuos asilvestrados en Chile, se presume llegaron junto con alguna importación efectuada por el Metro de Santiago. En la actualidad están siendo comercializados en algunas ferias libres, transformarse en una amenaza a la biodiversidad en el mediano a largo plazo. En el extranjero existen algunos registros de consumo de lagartijas pequeñas, además podría generar competencia con otros gekos que habitan en otras zonas del país.

