



ZORRO CULPEO



Nombre científico:

Lycalopex culpaeus

Nombre Común:

Zorro Culpeo, Zorro colorado, Zorro rojo.

Clasificación:

Familia Canidae.

Características: Presenta hábitos crepusculares, aunque la mayoría de sus presas las captura en la noche. Es un cazador solitario y oportunista. Ambos padres se turnan para alimentar a la camada que puede alcanzar hasta 8 ejemplares. El apareamiento ocurre entre agosto y octubre y las crías tienen una gestación de unos 60 días aproximadamente.

Tamaño: 1 a 1,2 m., de los cuales 35 a 45 cm. corresponden a la cola.

Aspecto físico: El pelaje de la cabeza y orejas es notablemente rojizo y es característico su hocico puntiagudo y alargado con la mandíbula blanca grisácea, más oscura hacia el final. El pelaje de la espalda y hombros es gris blanquecino y algo más largo que el del resto del cuerpo, aunque esta variante se intensifica en las zonas de bajas temperaturas. Ocasionalmente se observan líneas transversales y sus costados son de coloración rojiza. La cola presenta una mancha oscura en la superficie dorsal y en su primera mitad, el resto es negra y por debajo se vislumbra un tono bronceado claro. Las patas son rojizo ámbar y los pies más claros, casi blanquecinos, con cinco dedos.



Alimentación: Su alimentación consiste en pequeños mamíferos, especialmente liebres, ratones y vizcachas. También se alimenta de huevos, aves, frutos de molle, litre y peumo, entre otros.

Biología: El zorro culpeo o colorado está presente en una gran variedad de climas, aunque prefiere los límites de arroyos y comunidades arbustivas y densas, desde los 0 hasta los 4.500 m.s.n.m.

Distribución geográfica: Desde Colombia hasta Tierra del Fuego. En Chile habita desde Arica a Magallanes.

Estado de Conservación: UICN. Peligro de extinción desde XI a XII.