




SAPO ARRIERO



Nombre científico:

Alsodes nodosus.

Nombre común:

Sapo Arriero, Sapo cPopeye.

Clasificación:

Familia Cycloramphidae.

Características: Endémico. Marcado dimorfismo sexual. El canto nupcial del macho recuerda un silbido de arriero de donde deriva uno de sus nombres comunes. Sus huevos son grandes y blanquecinos, con posturas bajo piedras en arroyos de bajo caudal.

Tamaño: 8 cm.

Aspecto físico: Especie de tamaño mediano a grande, cuerpo robusto. Machos con antebrazos fuertemente engrosados (“Sapo Popeye”) y parches circulares de espinas de queratina en el pecho, conjuntamente con espinas en el primer y segundo dedo de las manos, no presente en las hembras. Piel granulosa y tímpano recubierto por la piel, impidiendo que se visualice. Coloración dorsal generalmente gris con manchas oscuras. Extremidades con barras transversales oscuras, particularmente las posteriores. Banda negra en ambos lados de la cabeza, la que comienza en las narinas y termina en el antebrazo, atravesando el ojo. Este último de aspecto reticulado. Larvas grandes, pueden alcanzar hasta los 5,2 cm. (cuerpo más cola), ligeramente deprimidas dorso-ventralmente, con boca francamente ventral.

Alimentación: Carnívoro.

Biología: Quebradas costeras y cordilleranas, desde 0 a 1.500 m.s.n.m., que sean ricas en vegetación con abundante agua corriente.



Distribución geográfica: Desde el sur de la Región de Coquimbo hasta la Región de O'Higgins.

Estado de conservación: IUCN próxima a amenaza. En peligro de extinción (Regto. Ley de Caza, 1998). Insuficientemente conocida (MINSEGPRES 2008).