

# *Equisetum bogotense* Kunth

EQUISETACEAE

Nombres vulgares: Limpiaplata, yerba del platero, kelü-lawen

Hierba perenne con rizoma subterráneo, muy ramificado. Tallos aéreos débiles, de 10 a 60 cm de alto, con nudos y entrenudos notorios, de 1 a 2 mm de diámetro, con 4 a 6 costillas ubicadas a lo largo del entrenudo, dejando valéculas profundas. Hojas pequeñas, de 3 a 6 mm de largo, soldadas lateralmente formando una vaina alrededor del tallo, con una costilla central que es la continuación de la costilla del tallo. Esporangios ubicados en estróbilos terminales, obtusos, de 1,5 a 2,4 cm de largo, sobre pedúnculos de 1 a 1,6 cm de largo. Esporas redondeadas, con eláteres.

**Caracteres relevantes:** Tallos con nudos y entrenudos notorios, hojas muy pequeñas, soldadas entre sí formando una vaina alrededor del tallo. Esporangios ubicados en estróbilos en el extremo de las ramas. Muy apreciada en medicina popular chilena, se recomienda la infusión teiforme contra los cálculos vesicales y renales. Considerada un buen diurético y parece tener cierta acción astringente útil en las disenterías.

América central y austral. En Chile crece en lugares húmedos, cerca de los arroyos y vertientes, especialmente donde abunda el agua, se encuentra desde la provincia de Arica hasta la provincia de Aisén, desde cerca del nivel del mar hasta los 3.200 m de altitud.



