

Blechnum hastatum Kaulf.

BLECHNACEAE

Nombres vulgares: Arriquilquil, palmilla

Hierba perenne con rizoma erecto o algo oblicuo, escamoso. Hojas pinnadas, monomorfas, generalmente de 10 a 70 cm de largo; pecíolo de 3 a 25 cm de largo, con escamas en la base, caedizas; lámina subherbácea a coriácea, de contorno oval-lanceolado, ápice alargado y agudo, base ancha, truncada hasta aflechada; raquis con pelos pluricelulares dispersos; pinnas glabras o con escasos pelos dispersos, con la base más o menos auriculada, unidas al raquis por un pecíolulo breve; pinnas apicales gradualmente adnadas al raquis. Soros en cenosoros submarginales, que ocupan tres cuartos o más del largo de la pinna, con frecuencia interrumpidos; indusio papiráceo, lateral, blanquecino, algo lacerado.

Caracteres relevantes: Lámina lanceolada de hasta 70 cm de largo. Cenosoros alargados ubicados cerca del margen de la pinna. Se ha usado sus raíces en medicina popular como emenagogo.

Nativo de Chile y Argentina, en el país crece desde Fray Jorge (provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altitud en la Cordillera de los Andes, también se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández. Este helecho crece en lugares abiertos, bajo arbustos, en la vecindad de vertientes o corrientes de agua, pero es raro en los lugares pantanosos. Es la especie del género en Chile que exige menos humedad.



