

Rumohra adiantiformis (G. Forster) Ching

DRYOPTERIDACEAE

Hierba perenne con rizoma largamente rastre-ro, carnoso, grueso, de 2 a 11 mm de diámetro, densamente escamoso. Hojas coriáceas, de 30 a 65 cm de largo; pecíolos separados, acanalados, de 2,5 a 40 cm de largo, con escamas castaño claras cerca de la base; lámina tripinnada, deltoide, lanceolada a anchamente aovada; raquis y raquillas acanalados, más o menos cubiertos de escamas pequeñas, castaño claras; 7 a 15 pares de pinnas pecioluladas, alternas, lanceolado-deltoides a aovado-deltoides; últimos segmentos sésiles, decurrentes en el raquis, glabros, alternos, oblongo-lanceolados, distantes, ápice obtuso, algunas veces agudo, margen con dientes crenados. Soros de posición mediana, orbiculares, indusio persistente, peltado, con el centro oscuro.

Caracteres relevantes: Hojas coriáceas, tripinnadas; raquis y raquillas más o menos cubiertos de escamas pequeñas, castaño claras; últimos segmentos sésiles, glabros. Soros de posición mediana, orbiculares, indusio persistente. Es un importante helecho ornamental en jardines y su reproducción vegetativa se realiza por fragmentación del rizoma.

Subcosmopolita, en Chile se encuentra desde la provincia de Limarí hasta la provincia Antártica Chilena, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.200 m de altitud.



