

# *Gleichenia litoralis* (Phil.) C.Ch.

GLEICHENIACEAE

Hierba perenne con rizoma rastrero, de 2 a 2,5 mm de diámetro, sin escamas. Hojas de 40 a 50 cm de largo, con ramificación tricótoma; pecíolos separados más o menos cada 5 cm, de la mitad del largo total de la hoja; entre la primera ramificación y las siguientes hay un espacio donde las pinnulas son escasas, algunas más o menos atrofiadas y con tendencia a ubicarse sólo hacia el lado interno; raquis central de 10 a 15 cm de largo, con escamas deltoides subenteras; pinnas lanceoladas, gradualmente acuminadas, de 12 a 20 cm de largo por 4 a 4,5 cm de ancho; últimos segmentos coriáceos, de color castaño, de más o menos 15 mm de largo. Soros con 3 a 4 esporangios, claramente visibles, no cubiertos por el borde revuelto del último segmento.

**Caracteres relevantes:** Hojas con ramificación tricótoma; entre la primera ramificación y las siguientes hay un espacio donde las pinnulas son escasas, algunas más o menos atrofiadas y con tendencia a ubicarse sólo hacia el lado interno. Soros con 3 a 4 esporangios, sin indusio, claramente visibles, no cubiertos por el borde revuelto del último segmento.

Especie endémica de Chile, que habita escasamente desde la Región de los Ríos hasta la provincia Última Esperanza, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.040 m de altitud.

**Estado de conservación:** Vulnerable.



Endémico



Amenazado



DICTYANOTA LINDLEYI (L.) C. Chr.  
Det. A. Soderstrom, 1964

DICTYANOTA LINDLEYI IN COCHILENSIS  
DICTYANOTA LINDLEYI

HERBARIUM UNIVERSITATIS COCHILENSIS  
1967  
DICTYANOTA LINDLEYI (L.) C. Chr.  
Det. A. Soderstrom, 1964  
DICTYANOTA LINDLEYI IN COCHILENSIS  
DICTYANOTA LINDLEYI  
M. M. M. M.