

Polystichum subintegerrimum (Hook. et Arn.) R.A. Rodr.

DRYOPTERIDACEAE

Hierba perenne con rizoma erecto, densamente cubierto de escamas linear-lanceoladas de color castaño oscuro. Hojas de 20 a 60 cm de largo, subcoriáceas; pecíolo de 7 a 25 cm de largo, con escamas linear-lanceoladas, castaño oscuras, ubicadas cerca de la base y escamas finas castaño claras hacia el ápice; lámina bipinnada, coriácea, deltoide-lanceolada, de 15 a 38 cm de ancho; pinnas subcoriáceas, las centrales con 6 a 8 pares de pinnulas bien marcas y hacia el ápice enteras; últimos segmentos deltoides, sésiles, con el ápice agudo, dentados en el margen, con escamas finas, castaño claras en la cara inferior. Soros circulares, 2 a 6 en cada segmento, protegidos por un indusio circular, caedizo.

Caracteres relevantes: Lámina bipinnada; pinnas las centrales con 6 a 8 pares de pinnulas bien marcas y hacia el ápice enteras; últimos segmentos sésiles, con el ápice agudo, con escamas finas, castaño claras en la cara inferior. Soros circulares, protegidos por un indusio circular, caedizo.

Se encuentra en Chile desde la provincia de Ñuble hasta la provincia de Chiloé, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.100 m de altitud. Crece en el piso del bosque, donde existen las condiciones adecuadas de sombra y humedad.

Estado de conservación: Vulnerable.



Endémico



Amenazado

