

# *Hymenophyllum umbratile* Diem et J. Licht.

HYMENOPHYLLACEAE

Hierba perenne, epífita, de 4,5 a 12,5 cm de alto, rizoma, castaño oscuro, con algunos pelos castaño negruzcos en las inserciones de los pecíolos. Hojas pendientes, distanciadas; pecíolo de 1,5 a 2,5 cm de largo, liso y desnudo; lámina pinnada-bipinnatífida, oblongo-lanceolada, de 4 a 10 cm de largo por 1 a 2,5 cm de ancho; raquis finamente alado; últimos segmentos dirigidos hacia el ápice de la lámina, lineares, de ápice truncado o ligeramente redondeado, glabros, planos, con el margen dentado en la mitad superior. Soros subaxilares, ubicados en la mitad superior de la lámina, no arqueados en la base; indusios bivalvos, oval-elípticos, irregularmente dentados en el borde superior, partidos lateralmente hasta tres cuarto de su longitud; receptáculo cilíndrico, con el centro algo engrosado, incluido en el indusio, cubierto casi totalmente de esporangios.

**Caracteres relevantes:** Hojas pendientes, distanciadas glabras; lámina pinnada-bipinnatífida, raquis finamente alado; últimos segmentos dirigidos hacia el ápice de la lámina, glabros, con el margen dentado en la mitad superior. Soros protegidos por indusios bivalvos, irregularmente dentados en el borde superior.

Nativo de Chile y Argentina, en el país se encuentra desde la Región de los Ríos a la provincia de Chiloé, desde casi el nivel del mar hasta los 500 m de altitud.





HERBARIUM UNIVERSITATIS DE ANTONIUM

no. 68843

UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

1970, 2. Sept. von Göttingen, im Garten  
des Prof. Dr. Göttingen, im Garten, Park 100  
m. h. l. 100-1000

10-10-1970

Dr. Göttingen, 1970

