

Blechnum asperum (Klotzsch) Sturm

BLECHNACEAE

Hierba perenne con rizoma erecto, corto, escamoso. Hojas pinnadas, dimorfas; las estériles de 20 a 35 cm de largo, peciolo glabro o con algunas escamas en su base; lámina estéril oblonga, coriácea, pinnas alternas u opuestas, algo falcadas, decurrentes en la base, disminuyendo gradualmente hacia el peciolo, provistas de pequeños apéndices rígidos, ásperos, especialmente en la superficie superior; además de las hojas estériles normales, brotan desde el rizoma una o dos hojas prolíferas, lineares, largas, con pinnas más o menos circulares y reducidas. Hojas fértiles de cerca de la mitad más pequeñas que las estériles, con las pinnas poco separadas entre sí, hasta casi tocarse. Soros reunidos en cenosoros continuos, cubriendo casi la totalidad de la cara inferior de la pinna; indusio continuo.

Caracteres relevantes: Hojas fértiles más pequeñas que las estériles, algunas hojas estériles prolíferas.

Especie endémica de Chile, crece desde la Isla Mocha (provincia de Arauco) hasta la provincia de Chiloé, entre los 15 y los 500 m de altitud. Se encuentra en lugares húmedos y frescos, en el piso del bosque sombrío.

Estado de conservación: Vulnerable.



Endémico



Amenazado

