

Curaeus curaeus


Tordo, *küreu*



Orden: Passeriformes

Familia: Icteridae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Región de Atacama hasta la Isla Navarino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo, especialmente sobre el dosel del bosque. Matorrales, praderas y áreas con actividades agrícolas. También en parques y jardines en la ciudad.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** no presenta amenazas inmediatas, sin embargo son susceptibles a la pérdida y degradación del hábitat. Son cazados en las zonas agrícolas, debido al daño que producen en cultivos frutícolas, como por ejemplo las vides.



Descripción e historia natural: el tordo es completamente negro, excepto el pico que es más grisáceo y es largo y fuerte. Posee una gran variedad de llamados y cantos, algunos de ellos muy melódicos. Muy gregario, se encuentra siempre en grupos o bandadas, alimentándose todos juntos. Es común observar a un único individuo de la bandada en lo alto de un árbol, como un vigía que avisa de peligros, mientras el resto de la bandada se alimenta a menor altura. Es probable que éste cumpla la función de centinela, avisando si se acerca alguna amenaza o depredador. Tienen una dieta omnívora, incluyendo insectos y frutos, según la disponibilidad. Se reproduce en la primavera, poniendo sus huevos desde octubre a diciembre.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar los bosques y matorrales nativos. Buscar medios alternativos de alejamiento de esta especie de los campos cultivados. Fomentar iniciativas de educación ambiental.