

Accipiter bicolor (*A. chilensis*)


Peuquito, *pichi kokoriñ*



Orden: Accipitriformes

Familia: Accipitridae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Región de Coquimbo hasta la isla Navarino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Hay algunos registros ocasionales en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Rara.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo, particularmente por la disminución del número de árboles grandes necesarios para construir su nido.



Descripción e historia natural: típica rapaz de bosque, muy buena voladora. Se reconoce fácilmente por su cola con franjas horizontales anchas y casi negras sobre fondo blanquecino. Tiene ojos amarillos y un pico ganchudo. Macho y hembra son bastante similares, aunque difieren en tamaño. Sin embargo, los juveniles tienen patrones de coloración diferentes. Se alimentan principalmente de aves de bosque, como zorzales, rinocriptidos y rayaditos. También consumen insectos y roedores, en menor cantidad. Construyen sus nidos formando una gruesa plataforma de ramas entrelazadas, que miden alrededor de 50 cm de diámetro. Lo ubican a gran altura (20 – 25 m), generalmente cerca del tronco de los árboles. Los huevos son de color celeste claro casi blanco. Se ha descrito que pueden tener hasta tres polluelos, de los cuales uno se ve “dominante”, es decir, con un mayor desarrollo corporal y del plumaje.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo y la presencia de árboles antiguos y/o grandes. Conservar vegetación de quebradas al interior de las plantaciones. Fomentar estudios científicos y monitoreos. Fomentar iniciativas de educación ambiental.