

## *Nannophryne variegata*



Sapo manchado, sapo de tres rayas



**Orden:** Anura

**Familia:** Bufonidae

- ▶ **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde el sur de Temuco en la Región de La Araucanía hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo, especialmente ambientes húmedos como mallines y hualves. En la Región de Magallanes habita en zonas de tundra magallánica y turberas.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Insuficientemente Conocido desde la Región del Bío Bío a la Región de Los Lagos. Fuera de Peligro desde la Región de Aysén a la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo. Incendios forestales. Canalización y embalses de cuerpos de aguas.



**Descripción e historia natural:** sapo de tamaño pequeño y robusto. Tiene la cabeza pequeña y el hocico corto y redondeado. Piel seca, gruesa y cubierta de protuberancias glandulares de color rojizo. Glándulas parótidas grandes y bien marcadas a ambos lados de la cabeza, cercanas al ojo. Piel dorsal cubierta por líneas de coloración amarilla, negra y verde. Faz ventral blanquecina con reticulaciones. Extremidades cortas y finas. De actividad diurna y nocturna, frecuenta tanto los hábitats acuáticos como los terrestres. Común bajo troncos caídos y hojarasca del suelo. El periodo reproductivo podría extenderse durante todo el año. La reproducción se lleva a cabo en pequeñas lagunas con fondo barroso. Ponen entre 350 y 450 huevos. La larva es de vida libre y se alimenta del sustrato. Junto a *Batrachyla antartandica* es la especie de anfibio más austral de Chile.

**Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo. Conservar quebradas y cuerpos de agua y evitar su modificación (por ejemplo represas). Conservar turberas y pomponales. Fomentar iniciativas de educación ambiental.