

Azara microphylla

Hook. f.

Chin-chin, roblecillo

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Salicáceas (antes en Flacourtiáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto muy vigoroso, de hasta 10 m de altura. Ramas firmes, grisáceas y con brotes vellosos. Hojas con pecíolos cortos, brillantes, redondeadas, de 0,8-1,5 cm de longitud, enteras; estípulas de forma similar a las hojas, pero menores. Las inflorescencias son cimas corimbosas, con 3-5 flores; androceo con 4-5 estambres. Florecen en primavera. Fruto, una baya redondeada amarillenta, madura en verano.

Hábitat: Crece en el sotobosque o en el margen de los bosques, en suelos ricos en nutrientes y con algo de humedad, pero bien drenados. Se encuentra en los bosques de tipo valdiviano y montanos de *Nothofagus dombeyi* (coigue).

Propagación: Se propaga por semillas extraídas de frutos macerados y sembradas de inmediato en almácigo estratificado, ya que como resultado de la maceración se da inicio a la germinación. En forma vegetativa se puede multiplicar en cama fría durante el verano mediante esquejes tratados con hormonas para que arraiguen.

Utilización: Arbusto resistente a nieve y heladas. En jardines se puede plantar formando parte de macizos de arbustos, donde destaca por su follaje delicado y brillante, o para aprovechar su intenso y agradable aroma a vainilla y chocolate, ubicándolo cerca de puertas o ventanas de modo que su perfume penetre a las habitaciones cercanas.



