

Azara integrifolia

Ruiz et Pav.

Challín, corcolón

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Salicáceas (antes en Flacourtiáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Valparaíso a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto de hasta 4 m de altura y diámetro variable. Ramas largas, cubiertas de vellos. Hojas pecioladas, aovadas, enteras, ligeramente revolutas, a veces con algunos dientes, estípulas grandes, redondeadas, menores que las hojas. Inflorescencias axilares, dispuestas en cimas racemosas, con 12 a 20 flores; androceo con 15-20 estambres. Florece durante la primavera. El fruto es una baya verde cenicienta con estilo persistente que madura en verano.

Hábitat: Se encuentra en quebradas húmedas a pleno sol en su dispersión sur y en semisombra hacia el norte en suelos ricos en nutrientes. Crece en los claros del bosque esclerófilo y de roble (*Nothofagus obliqua*).

Propagación: Se propaga por semillas que se extraen por maceración de los frutos, las que se siembran en otoño en almácigos estratificados.

Utilización: Se utiliza en jardines, donde se planta en suelos ricos en nutrientes. Requiere riego moderado. Se poda con el fin de conducir el crecimiento de modo armónico. Se ubica en lugares en que sea posible gozar de su perfume con aroma a vainilla.



