

Jovellana violacea

(Cav.) G. Don

Argenita morada

Floración:  **Fructificación:** 

Familia: Calceolariáceas (ex Escrofulariáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Bío-Bío a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, 1,5 m de altura por 0,80 cm de diámetro. Ramas erectas, delgadas, vellosas, de color café rojizo claro. Hojas pilosas, pecioladas, opuestas, láminas de hasta 3 cm de longitud, de borde aserrado, con la nervadura marcada en ambas caras y sobresaliente en el envés. Inflorescencia en panículas terminales con floresacampanadas, bilabiadas, morado-rosadas con pintas morado oscuras y un lunar amarillo en el labio inferior. Florece en primavera y verano. Fruto, una cápsula con numerosas semillas pequeñas que madura poco después de la floración.

Hábitat: Crece en las quebradas húmedas, con suelos ricos en materia orgánica. Se encuentra en la cordillera de la Costa y en el litoral.

Propagación: Se propaga en primavera por almácigo normal y en otoño por almácigo estratificado. De modo vegetativo se multiplica con facilidad en verano por esquejes que enraízan con rapidez en cama fría si se le aplican hormonas para que enraícen.

Utilización: Se puede plantar en zonas húmedas del jardín, en condiciones de semi-sombra donde destacará por su follaje y sus flores; la mejor forma de cultivo es, sin embargo, en macetas o jardineras para tenerlo más cerca y cuidarlo mejor.



