

Calceolaria cavanillesii

Phil.

Topa-topa, capachito

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Calceolariáceas (antes Escrofulariáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de La Araucanía.

Descripción: Arbusto siempreverde o caduco en invierno, forma una roseta laxa en la base, ramas tendidas que enraízan en forma espontánea formando cojines. Los brotes erectos son los que van a formar las flores. Hojas envainadoras, glabras por la haz y con pelos cortos y tiesos a lo largo del nervio central y en los márgenes por el envés, lámina oval-lanceolada con los márgenes doblemente aserrados. Inflorescencia de hasta 45 cm de longitud, delgada, vertical, dividida en múltiples cimas a partir de las hojas nodales del tallo, cada cima con 16 flores de color amarillo intenso. Florece a fines de primavera y comienzos del verano. Fruto, una cápsula pilosa con numerosas semillas; madura a fines del verano.

Hábitat: Crece en situación de semisombra, cerca de los cursos de agua. Se encuentra en la precordillera andina.

Propagación: Se propaga por semillas que se siembran en otoño en almácigo estratificado o normal en primavera. Tiene un bajo porcentaje de germinación y las plántulas son sensibles al ataque de hongos.

Utilización: Es preferible cultivarla en macetas o jardineras, porque necesita cambiarse de lugar, buscando un equilibrio de sombra, sol y horas luz. Se le pueden brindar mejores cuidados.



