

Myoschilos oblonga

Ruiz et Pav.

Orocoipo, codocoipo, codocoypu, sené

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Santaláceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones de Coquimbo a la de Magallanes.

Descripción: Arbusto caduco, de hasta 2 m de altura por 1,5 m de diámetro. Ramas erectas, las nuevas café-rojizas, las antiguas de corteza grisácea. Hojas glabras, simples, ovadas, de 3 x 2 cm, enteras, agudas, de color verde claro. Inflorescencia en amentos axilares, con 3 brácteas ovales, aparecen antes que las hojas. Flores sésiles, perigonio con 5 tépalos oblongos, de color rojo vivo, con un mucrón apical reflejo hacia adentro; androceo con 5 estambres opuestos a los tépalos, filamentos cortos con anteras blancas; gineceo con ovario ínfero, cubierto por un disco ondulado, estilo con estigma 3-lobulado. Florece en primavera. Aparecen primero las flores al lado de los frutos del año anterior y luego las hojas. Fruto, una drupa redondeada de color azul-morado, madura a comienzos del verano.

Hábitat: Crece en suelos algo húmedos con buen drenaje, ricos en nutrientes. Se encuentra en los márgenes o en el sotobosque de la mayoría de los tipos bosque del país.

Propagación: Se propaga por semillas, extraídas de frutos macerados, en otoño, en almácigo estratificado, o normal en primavera. De modo vegetativo se puede multiplicar, durante el invierno, mediante estacas, de madera de crecimiento de los dos últimos años, con hormonas para que arraiguen.

Utilización: En jardines se puede plantar aislado o mezclado con arbustos de hoja persistente. También se puede ubicar en las orillas o cerca de los cursos de agua. Es ornamental por su follaje de color verde claro, por sus brillantes flores rojas y por sus frutos.



