

# Calceolaria talcana

Grau & C. Ehrhart

(Antes incluida en *Calceolaria integrifolia* L.)

Capachito, topa-topa

Floración:



Fructificación:



**Familia:** Calceolariáceas (antes Escrofulariáceas).

**Origen geográfico:** Endémica de Chile.

**Distribución en Chile:** Regiones del Bío-Bío a la de la Araucanía.

**Descripción:** Arbusto siempreverde, de hasta 80 cm de altura ramoso y ramificado, ramas libres de hojas, las más antiguas leñosas y con vellos seríceos. Hojas sésiles, rugosas por la haz, seríceas por el envés, con los pelos dirigidos hacia el ápice de la hoja y con menos pelos pero rojizos por el envés, lámina aovado-elíptica, márgenes aserrados o dentados, con los dientes dirigidos hacia abajo. Inflorescencia en cimas terminales de hasta 20 flores, claramente separadas de la parte vegetativa, de color amarillo oro con el labio superior corto, ancho e inflado sobre todo en la parte distal y el labio inferior ovalado con una depresión central superior hacia la garganta. Florece a fines de primavera comienzos de verano. El fruto es una cápsula con numerosas semillas, madura a fines de verano y en otoño.

**Hábitat:** Se encuentra cerca de la costa y en la cordillera de la Costa, en taludes, barrancos o en laderas soleadas, en suelos con buen drenaje.

**Propagación:** Se propaga por semillas que se siembran en almácigo estratificado durante el otoño o normal en la primavera.

**Utilización:** Se planta en jardines para ornamentar prados de flores o se cultiva en macetas, jardineras o balcones cuidando siempre que quede a pleno sol.



