

Calceolaria meyeniana

Phil. ssp. *glabrata* (Phil.) C. Ehrhart

Capachito, topa-topa

Floración:



Fructificación:



Familia: Calceolariáceas (antes Escrofulariáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Valparaíso a la de La Araucanía.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 70 cm de altura por 50 cm de diámetro. Ramas principales leñosas y profusamente ramificadas, alcanzando la parte vegetativa no más de 35 cm de altura, con entrenudos de 1 cm y brotes cortos en las axilas de las hojas; éstas de anchas a elípticas, de 3 a 4 cm de largo con los márgenes desde débilmente dentados a doblemente aserrados. Inflorescencia glabra, de 10 a 30 cm de largo, con cimas densas, de hasta 16 flores color amarillo oro, con el labio superior ovalado del mismo largo que el inferior, éste último ovalado, inflado, con su parte superior abollada lo que la acerca a la parte inferior. Florece en primavera. Fruto, una cápsula con numerosas semillas pequeñas, madura en verano.

Hábitat: Crece en condiciones de semisombra, en bosques no muy densos. Se encuentra en ambas precordilleras.

Propagación: Se propaga por semillas que se siembran en otoño, en almácigo estratificado o normal en primavera.

Utilización: Se planta delante de macizos arbustivos, o mejor aún, en macetas para proporcionarle los cuidados adecuados.



