

Gochnatia foliolosa

D. Don

Mira-mira

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Asteráceas (Compuestas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Coquimbo a la de La Araucanía.

Descripción: Arbusto caduco en verano, facultativo, de hasta 2 m de altura por 1,5 m de diámetro. Ramas erectas, las antiguas desnudas, las nuevas pilosas. Hojas con pecíolos cortos, lanceoladas, láminas con su mitad distal con glándulas oscuras y pegajosas, márgenes enteros o dentados. Flores en capítulos reunidos en corimbos, todas tubulares, con el ápice bipartido de color blanco-rosado o blanco-azulado. Florece desde mediados de primavera a mediados del verano. El fruto es un aquenio provisto de un vilano de pelos finamente dentados, de color blanco-marfil, madura en otoño.

Hábitat: Crece en suelos secos, pedregosos, laderas soleadas y entre roqueríos, a pleno sol. Es resistente a viento, heladas, nieve y períodos de sequía. Es parte del bosque y del matorral esclerofilos.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en almácigos normales en primavera o estratificados en otoño. Vegetativamente se puede multiplicar, a fines de invierno, por estacas, con hormonas para que arraiguen y se plantan directamente en su lugar definitivo, pero tienen un bajo porcentaje de prendimiento.

Utilización: En paisajismo se utiliza para iluminar sectores soleados, donde tanto las flores como los vilanos brillarán al sol. Se puede plantar en sectores con rocas donde suavizarán el paisaje, entre otros arbustos de tonos más oscuros para crear efectos de luz o en terrenos secos y desnudos de laderas para colaborar en la recuperación de los suelos.



