

# Ribes cucullatum

Hook. & Arn.

Zarzaparrilla de cordillera



**Familia:** Grossulariáceas.

**Origen geográfico:** Endémica de Chile y Argentina.

**Distribución en Chile:** Regiones de Valparaíso hasta la de Magallanes.

**Descripción:** Arbusto caducifolio en invierno, de hasta 80 cm de altura por el mismo diámetro. Ramas cortas y muy ramificadas. Hojas glabras, verde oscuras por la haz y más claras y grisáceas por el envés, con tres lóbulos marcados, a veces, sobrepuestos simulando cinco, margen de los lóbulos dentado. Flores en racimos de 6 cm de longitud; cáliz con sépalos aovados, rojos por dentro y verde amarillentos por fuera; corola ausente. Florece en verano. Fruto, una baya verde-negruzca, con 3 a 5 semillas oscuras, madura en otoño.

**Hábitat:** Crece en suelos con nutrientes, algo de humedad y buen drenaje. Se encuentra en ambas cordilleras en el sotobosque de *Nothofagus pumilio* (lenga) o en el matorral subandino.

**Propagación:** Se propaga por semillas que se obtienen de frutos macerados, las que se siembran en otoño en almácigo estratificado. Se multiplica vegetativamente mediante esquejes en cama fría en verano, los que se tratan con hormonas para que enraícen.

**Utilización:** En jardines se utiliza como primer estrato arbustivo, también en macetas y jardineras o para crear bonsái.



