

Solanum valdiviense

Dunal

Tomatillo, natri

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Solanáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Bío-Bío a la de la Araucanía.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 1 m de altura por similar diámetro. Ramas largas, de sección prismática. Hojas pecioladas, alternas, simples, desde lanceoladas a oblongas, a veces, lobuladas en la base y siempre acuminadas. Las flores se reúnen en inflorescencias de 5 a 10 unidades laterales o terminales, son de color morado y están formadas por un cáliz con 4 a 5 sépalos, una corola con 4 a 5 pétalos, linear-oblongos; androceo con cinco estambres con las anteras confluyentes en torno al estilo en el centro de la flor. Florece en primavera y verano. El fruto es una baya amarillo-verdosa, madura a fines del verano.

Hábitat: Crece en condición de semisombra, en los claros o en los márgenes de los bosques, en suelos con algo de humedad, pero con buen drenaje. Se encuentra en los bosques de *Nothofagus obliqua* (roble) y de *N. dombeyi* (coigue), en ambas cordilleras.

Propagación: Se propaga a fines del verano o comienzos del otoño, las semillas se extraen de frutos macerados en agua fría por 15 días; se siembran de inmediato en almácigo estratificado.

Utilización: En jardinería es apreciada por sus abundantes flores de un color poco frecuente y porque atrae a una especie de abejorro chileno, *Bombus dahlbomii*, que se encuentra en riesgo de extinción. Se planta en condiciones de semisombra a orillas de árboles o entre otros arbustos. Es además decorativo por sus frutos. Puede ser cultivado en macetas o jardineras.



