

Solanum crispum

Ruiz et Pav. (Incluye a *S. ligustrinum* Lodd. y *S. gayanum* (J. Remy) Reiche)

Natri, hierba del chavalongo, natreng, contulmo

Floración:



Fructificación:



Familia: Solanáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones de Coquimbo a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 8 m de altura, crece como apoyante sobre otros arbustos. Tallos erectos, pulverulentos cuando nuevos. Hojas con peciolos de 1,5 cm, alternas, simples, glabras, aovado-lanceoladas a oblongas, de 13 x 3 cm, acorazonadas, acuminadas, enteras o levemente festoneadas, lámina delgada. Inflorescencia en corimbos terminales; cáliz con 5 sépalos unidos con los extremos libres; corola con 5 pétalos unidos, violáceos, tubo de 12 mm de longitud; androceo con los estambres con anteras amarillas confluyentes hacia el centro de la flor, rodeando al estilo; gineceo con ovario súpero y estigma capitado. Florece a fines de primavera y durante el verano. Fruto, una baya roja que madura a fines del verano.

Hábitat: Crece en suelos húmedos y ricos en materia orgánica. Es parte de los bosques de *Nothofagus obliqua* (roble) y *N. dombeyi* (coigue) donde crece en el sotobosque o en sus claros.

Propagación: Se propaga por semillas extraídas de frutos macerados las que se siembran de inmediato en almácigo estratificado.

Utilización: La planta se usa en muchas partes como planta de jardín, por su follaje, la larga duración de su floración y las bonitas bayas rojas. Debe plantarse lejos del alcance de niños pequeños debido a la toxicidad de sus bayas. En medicina alternativa se lo utiliza como febrífugo.



