

Baccharis patagonica

Hook. et Arn.

Chilca

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Asteráceas (Compositae).

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de Magallanes.

Descripción: Arbusto erguido, de hasta 1 m de altura por el mismo diámetro. Ramas café rojizas, cubiertas por glándulas. Hojas sésiles, oblongas a obovadas, de 0,8-2,5 x 0,3-1,1 cm, dentadas, 1/3 o 2/3 de su longitud. Capítulos sésiles, axilares dispuestos a lo largo de las ramas. Florece a fines de primavera. Fruto, un aquenio con vilano de pelos blancos, fructifica en verano y otoño.

Hábitat: Crece en laderas a pleno sol. Prefiere ambientes de montaña, en los bosques alterados de *Nothofagus dombeiyi* (coigue), *N. antarctica* (ñirre) y *N. pumilio* (lenga), crece como planta pionera.

Propagación: Se propaga por semillas las que se siembran con los vilanos para no dañar al embrión, éstas se disponen en almácigo estratificado durante el otoño. Se multiplica vegetativamente mediante estacas, a las que se le elimina la mitad inferior de las hojas y se las trata con hormonas para que arraiguen, a fines de invierno se plantan en el lugar definitivo.

Utilización: Se puede usar en localidades templado-frías de la Región, para revegetar terrenos que se encuentren descubiertos o degradados. En jardín puede formar parte de grupos de arbustos ornamentales por follaje. Plantado por estacas crece con más rapidez.



