

Eupatorium glechonophyllum

Less.

(*Ageratina glechonophylla* (Less.)

R.M. King et H. Rob.)

Barba de viejo

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Asteráceas (Compuestas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Atacama a la del Bío-Bío.

Descripción: Arbusto caducifolio de verano, de hasta 1,5 m de altura por el mismo diámetro, de forma globosa. Ramas erectas, densas, hojosas. Hojas pecioladas, opuestas, ovadas, dentadas, agudas, acorazonadas, recorridas por 3 nervios. Flores en capítulos, los que se agrupan en corimbos, todas tubulares, de color blanco. Florece desde fines de invierno hasta el verano. Fruto, un aquenio con vilano de pelos blancos, madura en verano.

Hábitat: Crece en laderas, quebradas o a orillas de caminos, en suelos húmedos, con buen drenaje y ricos en materia orgánica. Es parte del bosque esclerófilo y de los matorrales de las terrazas costeras.

Propagación: Se propaga por semillas, que se siembran con vilano, si no es posible extraerlo; se disponen en otoño, en almácigos estratificados. Se multiplica vegetativamente en verano, en cama fría, mediante esquejes terminales o subapicales, a los que se les aplican hormonas para que arraiguen, proceso que toma entre 15 y 30 días.

Utilización: Es muy apreciado en jardinería por lo abundante y prolongado de su floración, por la densidad y colorido del arbusto, por su resistencia a plagas y enfermedades y porque se combina muy bien con otros arbustos. Se puede plantar en pendientes, en grupos arbustivos, en bordes de senderos o en macetas y jardineras.



