

# Ribes punctatum

Ruiz et Pav.

Zarzaparrilla, parrilla, uvilla, mulul

**Floración:** 

**Fructificación:** 

**Familia:** Grossulariáceas.

**Origen geográfico:** Endémica de Chile y Argentina.

**Distribución en Chile:** Regiones de Coquimbo a La Araucanía.

**Descripción:** Arbusto siempreverde, de hasta 60 cm de altura por 50 cm de diámetro. Ramas erectas, ramificadas de corteza grisácea. Hojas con tres lóbulos, márgenes aserrados, glabras por ambas caras y glanduloso punteadas, con glándulas amarillas, por el envés. Inflorescencias en racimos péndulos, densos, de hasta 8 cm de longitud. Flores con el tubo del cáliz cilíndrico, con los pedúnculos más o menos del mismo largo de las flores, éstas de color amarillo. Florece en primavera. Fruto, una baya, primero rojiza y luego negruzca que madura durante el verano.

**Hábitat:** Crece en zonas con suelos húmedos, ricos en materia orgánica, pero con buen drenaje, a pleno sol o en semisombra. Se encuentra en el bosque esclerófilo y en el de *Nothofagus obliqua* (roble).

**Propagación:** Se propaga por semillas obtenidas de los frutos macerados, las que se siembran de inmediato en un almácigo estratificado. Se multiplica vegetativamente por estacas que se toman a fines de invierno, a las que se les aplica hormonas para que enraícen y se plantan directamente en el suelo o bien por esquejes terminales, en cama fría, en verano.

**Utilización:** Se planta en los jardines, como arbusto aislado o para formar grupos de arbustos, se usa como punto central de prados de hierbas de bulbo o rizomatosas, también para su cultivo en macetas o jardineras. Los frutos aunque pequeños son comestibles. En medicina alternativa se lo recomienda para diarreas, hemorragias y en pomadas para afecciones dérmicas.



