

Alstroemeria violacea

Phil.

» R.A. Philippi, Fl. Atacam. 51. 1860. TIPO: CHILE, In regione litorali herbosa deserti crescit, Hueso Parado (Lectotipo: SGO 47065, designado por Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003; Isolectotipo: SGO 38134).

Sinónimos: *Alstroemeria paupercula* Phil., Fl. Atacam. 51. 1860; *Alstroemeria violacea* Knight & Perry ex Loudon, Hort. Brit. Suppl. III: 485, 1850, nom. nud.

Descripción: Hierbas perennes, rizomatosas de hasta 50 cm de alto; tallos lisos o enteramente escamoso-papiloso. Hojas ovado-lanceoladas, de 2,5- 6 cm de largo por 1,5-3 cm de ancho, pecioladas, pecíolo y lámina con márgenes ondulados. Inflorescencia de 3-4 rayos 2 ó 3 divididos. Flores liláceas de tonos variables, hasta blancas; tépalos de 3-4,5 cm de largo; tépalos externos de 1,8-2 cm de ancho, con márgenes denticulados, a veces ondulados, truncados o emarginados en el ápice, con un mucrón oscuro de 1-2 mm de largo; tépalos internos superiores oblanceolados, redondeados o agudos, con un mucrón corto en el ápice, con una mancha blanca en la mitad inferior y una mancha amarilla en la zona media y con líneas cortas, purpúreas, desde la zona media hasta la base; tépalo interno inferior de la misma forma y color que los superiores, sin rayitas. Anteras violáceas. Cápsula café, de 1,6-2 cm de largo, coronada por el resto del estilo de 1,4 cm de largo. Semillas de 3 mm de diámetro.

Fenología: Florece entre agosto y noviembre, con frutos desde octubre (Macbride 1936, Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Origen: Nativa, se encuentra también en Perú (Arequipa, Moquegua y Junin) (Quipuscoa et al. 2016).

Distribución geográfica y hábitat: El lectotipo designado por Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2003) proviene de la localidad de Hueso Parado (25°23'S) en la Región de Antofagasta. También ha sido recolectado en la costa de las regiones de Tarapacá (Punta Gruesa, Iquique, 20°22'S), Atacama y Coquimbo (Choapa, Caleta Oscuro, 31°25'S), siempre por debajo de los 900 m s.n.m. Johnston (1929) la cita para Barquito (Atacama), Paposo, Taltal (Antofagasta) y Agua Grande (Coquimbo), como una hermosa planta común en laderas rocosas.





Observaciones: El nombre *A. violacea* fue utilizado por Knight & Perry en 1850, pero es ilegítimo porque es un "nomen nudum" (nombre que designa un taxón sin una descripción o diagnóstico o sin referencia a una descripción o diagnóstico). Por tanto, este nombre queda disponible. Bayer (1987) utiliza como nombre válido a *A. paupercula* Phil., descrito en *Florula Atacamensis*: 51 bajo el número 371. El nombre válido, como lo hacen ver Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2003) es *A. violacea* Phil. descrito en el mismo trabajo pero bajo el número 370. Por tanto, *A. violacea* Phil. tiene prioridad y es el nombre válido de esta especie.

