

Alstroemeria philippii

Baker

a. Alstroemeria philippii Baker var. *philippii*

» J.G. Baker, Handb. Amaryll. 140. 1888. TIPO: "Hab. in Chili; 20 miles from Carrizal Bajo" KING (Holotipo: K; isotipos E, SGO 47063).

Descripción: Hierbas perennes, rizomatosas de hasta 60 cm de alto. Hojas ovadas a lanceoladas de 4-6 cm de largo por 0,5-1,2 (-2,4) cm de ancho, pecioladas, resupinadas, márgenes ondulados, con escamas triangulares y papilas, nervios sobresalientes y escamosos; las hojas cercanas a las inflorescencias más cortas, lineares y agudas. Inflorescencia de 2-3 rayos, 1-3 divididos. Flores de color violáceo; tépalos externos de 5-6,5 cm de largo, 3,2-4,5 cm de ancho, redondeados, con márgenes denticulados, ápice emarginado con mucrón ancho y oscuro de 1,5-2,5 mm de largo; tépalos internos superiores más largos que los externos, oblanceolados, redondeados a truncados, con un mucrón corto, con una franja amarilla en la parte media, violáceo claro hacia el ápice y con abundantes rayas atropurpúreas en la franja amarilla y haciéndose más anchas y alargadas hacia la base, terminando en una mancha oscura; tépalo interno inferior más corto que los superiores, generalmente liso o a veces, con el diseño de manchas y colores como los superiores. Anteras violáceas. Cápsula café de 2,5 cm de largo, coronada con restos del estilo de 1,5 cm de largo. Semillas de color café de 3 mm de diámetro.

Fenología: Florece entre septiembre y octubre y fructifica en octubre (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat:

Distribución restringida desde el interior de la Región de Atacama, Bandurrias (27°51'S) hasta la costa de la Región de Coquimbo, Choros Bajos (29°20'S), desde el nivel del mar hasta 373 m s.n.m. Crece en roqueríos y arena del litoral e interior, con influencia de camanchaca.





Estado de conservación: Según el MMA (2014), está catalogada como Casi Amenazada (NT) según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE). Podría estar protegida en el Parque Nacional Llanos del Challe (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003). Ravenna *et al.* (1998) la clasifican como Rara por su distribución restringida.

Observaciones: El estado de conservación indicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA 2014), no especifica a cuál de las variedades se refiere. Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2003) la señalan como próxima a *A. magnifica* y, en algunos sectores, a *A. violacea*. Se aproxima también a *A. pulchra* por los tépalos internos superiores más largos que los tépalos externos (ver clave de los taxones).

