

Alstroemeria mollensis

Muñoz-Schick et Brinck

» M. Muñoz-Schick et A. Brinck, Gayana Botánica 60(2): 102. 2003. TIPO: CHILE, Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, central río Molles, 5 km más arriba del Retén, 2.100 m s.n.m., 10/12/2001, A. Brinck s.n. (Holotipo: SGO 149004, isotipo: SGO 149003).

Descripción: Hierbas perennes, rizomatosas, hasta de 20 cm de alto, con pocas hojas en floración, generalmente agrupadas cerca de las inflorescencias. Hojas linear-lanceoladas, de 1-3,5 cm de largo por 2-4 cm de ancho, gruesas, glaucas, no resupinadas, con nervadura notoria y márgenes levemente ondulados hacia el ápice. Inflorescencias de 4-6 rayos bifurcados de 1,1-5,5 cm de largo, papilosos o glabros. Flores rosado-pálidas; tépalos externos obovados, algo espatulados, con márgenes denticulados de 3,6-4,5 cm de largo por 1,6-1,8 cm de ancho, ápice redondeado con un mucrón ancho más oscuro o verde de 2 mm de largo; tépalos internos superiores más largos que los externos, oblanceolados, con mucrón apical, con manchas purpúreas, a veces más abundantes hacia la base, con una débil mancha amarilla en la zona media; tépalo inferior interno parecido a los externos y con manchas purpúreas como los internos superiores pero sin la mancha amarilla. Anteras café-purpúreas. Cápsula cuando inmadura papilosa, de 1-1,4 cm de largo, coronada por restos del estilo de 5-9 mm de largo.

Fenología: Florece en diciembre (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat: Distribución restringida sólo a la localidad tipo en la cordillera de la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, Río Molles, a más de 2.000 m s.n.m. (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).





Estado de conservación: En Peligro Crítico (CR B1ab(iii)+2ab(iii)), según Reglamento de Clasificación de Especies (Ministerio del Medio Ambiente 2018). No crece en ningún área protegida ni tampoco en sitios prioritarios (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Observaciones: Afín a *A. pallida* y *A. garaventae* (ver notas en la Clave de los taxones).



MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
HERBARIO SGO, CHILE

ALSTROEMERIACEAE
Alstroemeria pallida Graham

IV R. Km 1.5 desde Bocatoma de Central Los Molles.
30°44'41.9" Lat. S - 70°25'53.1" Long. W.
2436 msnm

Flóres con rayitas en los tépalos superiores, escasas en los otros. Con *Haplospappus*, *Aulimum* y *Baccharis*.

Muñoz M
N° 4537

21/01/2005