

❖ *Bazzania peruviana* (Ness) Trevis



Las características que distinguen a estas plantas, es su tamaño medio y su color verde oscuro a amarillento. Hojas fuertemente tridentadas, cuyo ápice es entero o aserrado a lo largo del margen apical. Sus anfigastrios connados (con un par de hojas), las cuales son esquarrosas y recurvadas en la mitad superior con borde hialinos de dos a ocho células de ancho, con márgenes apicales serrados a espinosos y dentados. Tienen una cutícula muy rugosa. Tallos de 5 cm o más. Hojas de 3,5 mm de ancho, postradas. Ramas laterales frecuentes; rizoides raros, sin color, sobre la base de las hojas

de las ramas flageliformes. Línea de inserción de la hoja sutilmente curvada en la parte superior, plana, algo reflexas al estar secas, asimétricamente aovadas, rectas. 1,5 mm a 2 mm de largo, 1 mm de ancho en la base, ápices fuertemente tridentados. Anfigastrios imbricados, subcuadrados en la línea externa, 6 mm a 8 mm de largo y ancho, más ancho que el tallo, insertadas en línea recta conspicuamente connadas, con un par de hojas comenzando a ser esquarrosas y fuertemente recurvadas en el mitad superior, ápice mas menos lobado. Dioicas. ■

Familia: Lepidoziaceae

Distribución en Chile:

Desde la Región de los Ríos a la Región de Magallanes. Archipiélago de Juan Fernández.

Distribución Global:

Sudamérica y América Central.

Singularidades:

Su forma de crecimiento es caracterizada por matas deprimidas o alfombras ascendentes sobre el suelo, rocas y bases de árboles. Frecuente en la superficie de troncos caídos.

