

Symphygyna rubritincta A. Evans

Plantas verde claras o coloreadas de color rojizo en las partes más viejas, los rizomas, estípites y cordones esclerosados; erectas o postradas, de 1,5 a 5 cm de largo, 2 a 6 mm de ancho en la porción talosa lobulada, ramificada 1 a 3 veces. Rizoma de 1,5 a 1,5 mm de ancho, cilíndrico o biconvexo con alas angostísimas. Lámina con lóbulos redondeados o agudos, dirigidos oblicuamente hacia fuera y adelante provistos de un diente apical de 1 a 3 cm de largo, acompañados por otros dientes secundarios vecinos. Senos agudos que llegan a más de la mitad del espacio entre la nervadura y el borde del lóbulo, menos profundos, apenas insinuados; nervadura prominente dorsal y ventral. Papilas dorsales, ventrales, apicales, sobre la nervadura; papilas mucilagíferas marginales ausentes. Rizoides en rizoma y estípite. Dioicas. Plantas masculinas

más pequeñas, escamas anteridiales con lóbulos agudos y dientes de varias células de largo, apenas imbricadas, en 2 a 4 hileras sobre la nervadura. Plantas femeninas con escamas involucrales de 1 a 1,5 mm de largo a 0,5 a 1 mm de ancho, con varias lacinias cortas truncas u obtusas con 1 a 2 dientes largos o cortos. Caliptra lisa, parda. Seta de 8 a 12 mm de largo. Cápsula castaña de 5 a 5,5 mm de largo. Esporas amarillentas con crestas muy cortas o verrugas muy distanciadas. ■

Familia: Pallaviciniaceae

Distribución en Chile:

Desde la Región de los Ríos a la Región de Magallanes.

Distribución Global:

Chile y Argentina.

Singularidades:

Comparte hábitat con *Symphygyna circinata*. Sus lóbulos en el talo son muy característicos.

