

Agrotis ipsilon

(Hufnagel, 1766)

Cuncunilla grasienta

Orden: **Lepidoptera**

Familia: **Noctuidae**



Descripción General

Adulto de tamaño mediano, entre 28 y 51 mm de envergadura alar. El cuerpo es grisáceo a castaño grisáceo; el abdomen es más claro que el tórax. Las alas anteriores son de color castaño oscuro en los dos primeros tercios basales. El segundo par de alas es claro. Los huevos son puestos en lugares con bastante humedad, las hembras ponen sus huevos en grietas en el piso, para cada hembra entre 1500 y 2500 huevos en verano y menos de la mitad en invierno. Las larvas miden entre 30 y 45 mm de largo por 7 mm de ancho. La cabeza es de color castaño rojizo. La piel es de color gris casi negro de aspecto grasiento. En el lado ventral y lateral tienen adornos pálidos.

Hábitat y rol trófico

Las larvas consumen raíces, hojas tiernas y cortan el cuello de la planta, se les considera en el grupo de los "gusanos cortadores", especialmente perjudiciales en plantas jóvenes. Al terminar de comer una planta se traslada a la planta más cercana. Los adultos tienen la capacidad de migrar a grandes distancias, incluso sobrevolar desiertos.

