

# *Ceroglossus chilensis*

(Escholtz, 1829)

Peorro

Orden: Coleoptera  
Familia: Carabidae



## Descripción General

Forma alargada, longitud entre 22 y 30 mm, presentan una gran variabilidad en la coloración del cuerpo, con la cabeza, tórax y élitros con tonalidades negras, verdes y azuladas iridiscentes; ventralmente el cuerpo es negro al igual que las patas y palpos maxilares y labiales. La cabeza y el pronoto son de color azul y están finamente puntuados. Élitros alargados, regularmente esculpidos y convexos con los ángulos humerales bastante pronunciados son de color rojo oscuro muy brillante. Carecen de alas metatorácicas.

El dimorfismo sexual es poco notorio. Los machos presentan en los segmentos antenales 6, 7 y 8 unas líneas solevantadas de disposición longitudinal (carenas) y los tarsos del primer par de patas ensanchados. Otra diferencia es que los machos presentan los élitros con el ápice redondeado, en cambio en las hembras es más aguzado.

## Hábitat y rol trófico

El ciclo de vida dura aproximadamente tres meses y los adultos se encuentran preferentemente en enero, febrero y marzo. Esta especie se encuentra preferentemente en hábitats xéricos y tolera bastante bien condiciones de aridez. Los adultos son omnívoros y depredadores activos de otros insectos; se les encuentra caminando libremente en el sotobosque. Las larvas son carnívoras y forman parte de la fauna epigea del sotobosque. Se ha detectado la presencia de *C. chilensis* en estado adulto y larvario en cadáveres de mamíferos.

Se encuentra en formaciones vegetacionales de bosque maduro de coigüe, lenga y en matorrales con ñirre y notro. También es abundante en plantaciones de pino y eucalipto de la zona central de Chile con sotobosque nativo.

