

Rhyephenes maillei

(Gay et Solier, 1839)

Cabrito, Gorgojo,
Martinerito negro

Orden: Coleoptera

Familia: Curculionidae



Descripción General

Presenta un cuerpo duro, de color completamente negro, las patas son muy alargadas y los élitros están soldados y cubiertos de pequeños tubérculos. Sus larvas (marzo y noviembre) son blancas, apodas y con cabeza libre y esclerosada, sin ocelos; pronoto subovalado, cubre aproximadamente la mitad basal de la cabeza. Tórax y abdomen sin pilosidad y abdomen con nueve segmentos.

Hábitat y rol trófico

Se encuentra asociado a corteza de árboles debilitados o muertos de especies nativas y exóticas, como laurel, coigüe, pino radiata y pino Oregón, entre otros. Larvas y pupas viven en el interior de la madera o bajo cortezas (septiembre y noviembre). Las larvas consumen desde la corteza a la albura del tronco. La pupa vive en una cámara ubicada en la capa externa de la albura, cubierta por un aserrín fibroso. Al emerger los adultos entre septiembre y abril, salen del tronco dejando un orificio circular de unos 4,5 y 6,5 mm de diámetro. Los adultos se alimentan de brotes o de savia y también se han registrado consumiendo brotes de ñirre.

