


# *Tachymenis chilensis*

Culebra de cola corta



**Orden:** Squamata  
**Familia:** Colubridae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde Paposo en la Región de Antofagasta hasta la Isla de Chiloé en la Región de Los Lagos. Desde 0 a 3000 msnm.
- ▶ **Hábitat:** bosques y matorrales nativos, también quebradas alto-andinas.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Vulnerable.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida de hábitat, especialmente vegetación de quebradas. Incendios forestales.



**Descripción e historia natural:** culebra de tamaño medio, nunca supera el metro de longitud. El largo de la cola corresponde aproximadamente a un quinto de la longitud total. Diseño de la cabeza formado por líneas y manchas negras pre, sub y postoculares. Diseño y coloración del cuerpo muy variable y dependiente de su origen geográfico, generalmente con fondo café grisáceo sobre el que se dispone una banda dorsal clara bordeada a ambos lados por bandas angostas negras. La coloración puede variar desde café melánico hasta un patrón general rojizo sin diseño. Pupila subelíptica. De hábitos terrícolas y buen nadador. Carnívora, su dieta se compone de herpetozoos con predominio de anfibios, aunque también consume huevos y polluelos, especialmente de aves que nidifican en el suelo. Venenosa pero no considerada peligrosa para el hombre, presenta una conducta más agresiva que la culebra de cola larga y su veneno sería más tóxico, aunque al igual que ésta, sus dientes inyectoros de veneno se disponen posteriormente en la maxila. Vivípara, paren hasta ocho culebrillas.

**Medidas de manejo para su conservación:** conservar bosques y matorrales nativos, especialmente mantener la vegetación nativa en quebradas o riberas en bosques y plantaciones forestales.