Chaltenobatrachus grandisonae







Orden: Anura

Familia: Ceratophrydae

- Origen: nativo.
- Distribución de la especie en Chile: Isla Wellington en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- Hábitat: bosque nativo, especialmente bosques húmedos de la Patagonia. También en tundra magallánica y en zonas anegadas como, turberas y mallines.
- Estado de conservación en Chile: Rara.
- Amenazas a su conservación: pérdida de bosque nativo. Modificación de cuerpos de agua. Extracción no sustentable de pompon en turberas y distribución restringida.

Descripción e historia natural: sapo de tamaño mediano. Coloración uniforme verde brillante, con el dorso y extremidades con verrugas de coloración rojiza. Vientre de coloración grisácea con pequeños puntos negros. Parche negro desde la nariz hasta el ojo. Extremidades cortas y finas. Tímpano ausente. Ojos protuberantes y grandes. Juveniles y adultos han sido encontrados bajo troncos caídos y en pequeños cuerpos de agua cerca del bosque. La reproducción se lleva a cabo en pequeñas zonas anegadas, tanto en el borde del bosque como en zonas frías y sombrías al interior del bosque. Se le ha encontrado junto a especies del género Alsodes y comparte sitios de reproducción con Nannophryne variegata. Se desconoce con exactitud su época reproductiva, sin embargo, se han encontrado larvas en enero. Se desconoce el canto de los machos, la conducta reproductiva, y el tipo de amplexus, ya que esta especie no se había registrado desde su descripción en 1958.



Medidas de manejo para su conservación: conservar el bosque nativo y los cuerpos de agua al interior de los mismos. Fomentar estudios científicos y monitoreos. Fomentar iniciativas de educación ambiental.