



Chaura, Murtillo, Chaura grande, Chausha, Charwa
Gaultheria phillyreifolia (Pers.) Sleumer
Ericaceae

Descripción: Arbusto siempreverde de hasta 2 m de altura. Hojas alternas, lanceoladas y mucronadas, coriáceas, márgenes dentados. Flores de color blanco, hermafroditas. El fruto es una cápsula redondeada, de color claro, recubierto por el cáliz pulposo color morado negruzco, con apariencia de baya. Sus semillas son pequeñas, de color amarillo.

Distribución: Regiones O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes.

Hábitat: Habita en el sotobosque o en terrenos que han perdido su cubierta vegetal.

Usos comestibles: Los frutos de la chaura, conocidos como chique, se consumen frescos y son aromáticos y de agradable sabor. También se ocupan en la preparación de dulces y para acompañar postres. Antiguamente se elaboraba una chicha ocasional para celebrar el chaura-cahuín, que era la fiesta de la chaura. Con los frutos también se elabora licor artesanal.

Usos medicinales: Posee propiedades antipiréticas, antisépticas y vulnerarias.

Propagación: Se colectan los frutos antes que se rompan las bayas, cuando están de color negruzco. Las semillas se siembran en almácigo estratificado en otoño en una mezcla de una parte de compost y media de arena y tierra de jardín. También se reproducen a través de esquejes que se enraízan en cama fría, en arena, en verano.

Observaciones: Especie de gran potencial agronómico. Actualmente se desarrollan estrategias para su cultivo con fines productivos.

