

Sporobolus densiflorus (Brongn.) P.M.

Peterson & Saarela

Sinónimo: *Spartina densiflora* Brongn.

FAMILIA POACEAE



Etimología: Del griego *spora*= semillas y *ballein*= tirar, aludiendo a la semilla cuando se libera y por la manera, a veces por la fuerza, de su lanzamiento.

densiflorus= que florece profusamente.

Nombre común: Llinto

Origen: Nativa, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

Descripción: Hierba perenne, acuática, arraigada al sustrato emergente, con rizomas cortos y culmos glabros, erectos, de 40-100 cm de alto, que sobresalen de la superficie del agua, hojosos hasta la parte superior; vainas lisas, largas, lígula ciliada, de 1-2 mm, agudas, normalmente curvas en la parte terminal, las de la parte media del culmo de 15-30 de largo por 5-6 mm de ancho. Panícula contraída, de 8-15 cm, compuesta por 3-7 o más espigas; espiguillas lanceoladas, de 8-12 por 1,5-2,3 mm, glabras o con asperezas; lema linear, aguda o subobtusada, de 3-6,5 mm, pálea de 8,5-11 mm, con el margen hialino. Fruto cariopsis alargado, de 6 mm, con la base de los estilos en su ápice.

Distribución: En Chile se encuentra en lugares costeros desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos.

Hábitat: En desembocaduras de ríos, especie que coloniza los límites de algunas playas, siempre en contacto con el mar quedando los rizomas sumergidos al subir la marea.

Observaciones: Tiene la característica de formar densos céspedes en zonas que quedan inundadas. También es importante como medio para la nidificación y alimentación de diferentes aves acuáticas.

