

# Eriosyce confinis

(Ritter) Kattermann 1994

**Sinónimo:**  
*Pyrrhocactus confinis* Ritter 1961

**Etimología:**  
*confinis*: Frontera o límite

**Distribución:**  
Región de Atacama, en cerros del Valle de Copiapó, sus alrededores y hacia el sur poniente.

**Descripción de la planta:**  
**Cuerpo:** Solitario, semiesférico a elongado, ápice algo hundido y epidermis verde. **Costillas:** De 13 a 22, angostas, pero ensanchadas a nivel de las areolas. **Areolas:** Recubiertas de fieltro blanquecino, angostas. **Espinas:** Amarillentas a oscuras cuando nuevas y grises con la edad, medianamente fuertes, derechas o algo dobladas hacia arriba. **Raíz:** Un tanto elongada. **Flores:** De 30 a 35 mm, angostas, con forma de embudo, pericarpelo y tubo floral con escamitas angostas y pequeñas motitas de lanosidad blanca. **Fruto:** Verde rojizo, alargado. **Semillas:** Negras, mate, no acostilladas.

**Hábitat:**  
Sólo conocemos una localidad donde habitan estas plantas y la población es extremadamente reducida. Habita en cerros costeros, entre las rocas, al sur del Morro Copiapó. Hay individuos adultos; pero no hemos encontrado renuevos o muchos signos de reproducción. La mayoría de las plantas tienen la epidermis marrón rojiza posiblemente por la alta exposición al sol y con las espinas más antiguas de color dorado. Esto y sus flores con tépalos abiertos y de color rosado a fucsia son un espectáculo que vale la pena proteger y conservar.

