

# Eriosyce chilensis

(Schumann) Kattermann 1994

## Sinónimo:

*Echinocactus chilensis* Schumann 1998

*Neoporteria chilensis* (Schumann) Britton & Rose 1922

*Pyrrhocactus chilensis* (Schumann) Ritter 1959

*Eriosyce chilensis* var. *albidiflora* (Schumann) Kattermann 1994

## Etimología:

*chilensis*: Nativo de Chile.

## Distribución:

Región de Valparaíso. Habita en la costa, en el límite entre la provincia de Choapa y la de Petorca.

## Descripción de la planta:

**Cuerpo:** Cuerpo solitario o escasamente ramificado, globoso a cilíndrico. **Costillas:** Hasta 26, ligeramente espiraladas, con mamilas poco pronunciadas. **Areolas:** Recubiertas de fieltro blanquecino o marrón. **Espinas:** Numerosas, densas, casi rectas, finas o relativamente gruesas, amarillentas a grisáceas. De 6 a 12 las centrales, alezadas; las marginales más largas de 15 a 35. **Raíz:** Fasciculada. **Flores:** Abundantes, apicales, de 3,5 a 5 cm. de longitud, con tépalos curvados hacia fuera de color rosado oscuro a amarillento o blanquecino. **Fruto:** De 1 a 1,5 cm. de largo. **Semilla:** Negras, muy rugosas.

## Hábitat:

Esta especie vive en un hábitat muy reducido en las costas de Pichidangui, el lugar está amenazado por la expansión de este balneario. Viven en los roqueríos con otras cactáceas, como *Eriosyce curvispina* (var. *mutabilis*), *Eriosyce subgibbosa* y *Echinopsis coquimbana*. Sus flores son de las más impresionantes en cuanto al colorido, los tépalos internos son amarillo cremosos y con las puntas rosadas, tornándose los más externos rosado completos, dando un efecto de degradé único. Las hay completamente rosadas y completamente amarillo pálido, éstas reciben el nombre de *Eriosyce chilensis* var. "*albidiflora*".

