

Echinopsis formosa

(Pfeiffer) Salm-Dyck 1850

Sinónimo:

Echinopsis formosus Pfeiffer 1837

Lobivia formosa (Pfeiffer) Dodds

Soherensia formosa (Pfeiffer) Backeberg

Etimología:

formosa: Del latín "Hermosa"

Distribución:

Región de Antofagasta, en montañas andinas al oeste de San Pedro de Atacama.

Descripción de la planta:

Cuerpo: Solitario o cespitoso, globular a columnar, grueso, de 20 a 35 cm. de diámetro, de hasta 1,5 m de altura. **Costillas:** De 15 a 50, romas, con mamilas sobre las cuales están ubicadas las areolas. **Espinas:** Amarillentas a rojizas, aciculares. Las radiales variables, hasta 15, de 3 a 10 cm. de largo. Las centrales de 4 a 9 y de 3 a 20 cm. de largo, poco diferenciadas. **Raíz:** Fasciculada. **Flores:** Salen alrededor del ápice, amarillas, de 6 a 8,5 cm. de longitud. **Fruto:** Esférico, de 3,5 a 4 cm. de diámetro, recubierto de escamas y abundantes pelos, con dehiscencia lateral; pulpa comestible, blanca, dulce y jugosa. **Semillas:** Negras y brillantes.

Hábitat:

Esta especie tiene distribución tanto en Chile como Argentina, es una planta de las alturas, vive sobre los 3.000 msnm. La hemos visto en las cercanías de San Pedro de Atacama, en el valle de Puritama (baños de Puritama) y en laderas rocosas de Cuesta del Diablo. Son plantas muy grandes, gruesas, con una gran cantidad de espinas que las ayudan a protegerse de las nevazones.

